




# ミニトマト編

## 病害虫注意報 2024年5月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

天窓・側窓を開放する時間が増えると、コナジラミ類の侵入も増えます。コナジラミ類によって伝搬するウイルス病は、減収に影響します。物理的・化学的防除を組み合わせる栽培終盤も乗り切りましょう。



### 黄化葉巻病(TYLCV)



新葉が黄化・萎縮し、葉巻症状を呈する。進行すると節間が短くなり株まで萎縮する。重度になると、着果不良になる。

**耐病性品種は症状が分かりにくい場合があります。**

### 黄化病(ToCV)



初期は下位葉の葉脈間の黄化が発生し、上位葉へも広がる。葉脈間の症状は、徐々にえぞ症状を伴う。これはマグネシウム欠乏に類似していると言われる。

## 今月のおすすめローテーション

対象病害虫によって希釈倍数が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。

| 時期      | RACコード | 対象病害虫                 | 薬剤名                 | 希釈倍数         | 使用時期 | 回数 | 影響日数<br>マルハナバチ |
|---------|--------|-----------------------|---------------------|--------------|------|----|----------------|
| 5月<br>① | 11     | 灰色かび病・葉かび病<br>すすかび病 等 | <b>ファンタジスタ顆粒水和剤</b> | 2,000~3,000倍 | 前日   | 3回 | 1日             |
|         | 9B     | アブラムシ類<br>コナジラミ類      | <b>チェス顆粒水和剤</b>     | 5,000倍       | 前日   | 3回 | 0日             |
| 5月<br>② | U06,3  | うどんこ病                 | <b>パンチョTF顆粒水和剤</b>  | 2,000倍       | 前日   | 2回 | 0日             |
|         | 4A     | コナジラミ類・アブラムシ類         | <b>バリアード顆粒水和剤</b>   | 4,000倍       | 前日   | 3回 | 1日             |
| 5月<br>③ | 7      | 灰色かび病<br>葉かび病・菌核病     | <b>カンタスドライフロアブル</b> | 1,000~1,500倍 | 前日   | 3回 | 0日             |
|         | 6      | ミカンキロアザミワ<br>コナジラミ類 等 | <b>アニキ乳剤</b>        | 1,000~2,000倍 | 前日   | 3回 | 1日             |

高温対策に！ 効果の持続は約3か月  
放出量は2倍

## すずみどりXL

香り成分で、葉焼けや萎れ等の高温障害を予防！  
更に光合成を向上

ハウス内に吊るすだけ  
10~20本/10a

※手で折り曲げてから  
吊るしてください



## ダブルシューターSE

1,000倍  
前日/2回/マルハナバチ3日

ハタニ類・コナジラミ類・ハメグリハニ類  
アザミワ類・オオハナバチ・トマトハナバチ  
コナジラミ類対策におすすめの1剤!!

