



# トマト編

## 病害虫注意報 2024年5月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

天窓・側窓を開放する時間が増えると、コナジラミ類の侵入も増えます。コナジラミ類によって伝搬するウイルス病は、減収に影響します。物理的・化学的防除を組み合わせる栽培終盤も乗り切りましょう。



### 黄化葉巻病(TYLCV)



新葉が黄化・萎縮し、葉巻症状を呈する。進行すると節間が短くなり株まで萎縮する。重度になると、着果不良になる。  
**耐病性品種は症状が分かりにくい場合があります。**

### 黄化病(ToCV)



初期は下位葉の葉脈間の黄化が発生し、上位葉へも広がる。葉脈間の症状は、徐々にえそ症状を伴う。これはマグネシウム欠乏に類似していると言われる。

## 今月のおすすめローテーション

対象病害虫によって希釈倍数が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。

時期	RACコード	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数	影響日数 マルハナバチ
5月 ①	11	灰色かび病・葉かび病 すすかび病 等	<b>ファンタジスタ</b> 顆粒水和剤	2,000~3,000倍	前日	3回	1日
	9B	アブラムシ類 コナジラミ類	<b>チェス</b> 顆粒水和剤	5,000倍	前日	3回	0日
5月 ②	U06,3	うどんこ病	<b>パンチョTF</b> 顆粒水和剤	2,000倍	前日	2回	0日
	4A	コナジラミ類・アブラムシ類	<b>バリアード</b> 顆粒水和剤	2,000~4,000倍	前日	3回	1日
5月 ③	7	灰色かび病 葉かび病・菌核病	<b>カンタスドライフロアブル</b>	1,000~1,500倍	前日	3回	0日
	6	ミカンキロアザミウマ コナジラミ類 等	<b>アニキ</b> 乳剤	1,000~2,000倍	前日	3回	1日

高温対策に！ 効果の持続は約3か月  
放出量は2倍

## すずみどりXL

香り成分で、葉焼けや萎れ等の高温障害を予防！  
更に光合成を向上

ハウス内に吊るすだけ  
10~20本/10a

※手で折り曲げてから  
吊るしてください



## ダブルシューターSE

1,000倍  
前日/2回/マルハナバチ3日

ハダニ類・コナジラミ類・ハメグリハメグリ類  
アザミウマ類・オオハナバチ・トマトハダニ  
コナジラミ類対策におすすめの1剤!!

