



カリフラワー編

病害虫注意報 2024年8月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

育苗期～定植前防除

育苗期にはミネクトデュオ粒剤がおすすめです！



適用害虫：コナガ・アブラムシ類
使用量：セルトレイ1箱、
 ペーパーポット1冊あたり40g
使用方法：散布
使用時期：育苗期後半
使用回数：1回

特徴

- チョウ目害虫やアブラムシ類に効果が高い
- 定植後1週間程度まで残効が期待できる※

※愛知県東三河地域の試験結果より



⚠ 注意 ⚠ ベリマークSC・ベネビアOD・アクタラ粒剤5・ジュリボフロアブル
 プリロッソ粒剤オメガ・アベイル粒剤・アクタラ顆粒水溶剤

**ミネクトデュオ粒剤を使用した場合、
 上記の薬剤は苗場での使用ができません!!**

害虫発生時は、適宜散布剤による防除を行ってください

| IRAC | 対象害虫 | 薬剤名 | 希釈倍数 | 使用時期 | 回数 |
|------|--------------------------|-------------|--------------|------|----|
| 5 | コナガ | スピノエース顆粒水和剤 | 5,000倍 | 3日前 | 3回 |
| 6 | コナガ・オタバコガ アオムシ・アザミウマ類 | アフーム乳剤 | 1,000～2,000倍 | 3日前 | 3回 |
| 22B | コナガ・ヨトウムシ・アオムシ | アクセルフロアブル | 1,000倍 | 前日 | 2回 |
| UN | コナガ・ヨトウムシ ハモエトウ | プレオフロアブル | 1,000倍 | 3日前 | 2回 |

フルボディ

腐植酸(フルボ酸・フミン酸)→土壌の団粒化
海藻抽出成分配合→根の伸長促進

定植ストレスを軽減・活着促進！

葉菜類使用例 1000～2000倍
500ml/セルトレイ 灌注 定植前



弱った株の回復に！

茶葉から抽出した
植物活力資材

カテキンパワー

1,000倍 葉面散布

大雨や強風で植物に傷がついたときに散布！
カビの病気を防ぐ農薬との混用がおすすめです☆

※ストレプトマイシン剤、キチン、キトサン類、カルシウム剤（ファイトカルを除く）、微量要素剤、鉄など金属を含む葉面散布肥料との混用は避ける。井戸水で、鉄分などを多く含む水での使用も避ける。



肥料登録
生第91402号