



キャベツ編

病害虫注意報 2024年11月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

べと病・菌核病 対策

11月以降にはべと病、菌核病の発生が多くなります。発病に注意して予防的な散布を行いましょう！



べと病

症状

- ▶ 葉脈に区切られた淡黄褐色の病斑
- ▶ 病斑の裏側に汚白色のかび

多発条件

- ▶ 9時間以上葉面が濡れた状態



菌核病

症状

- ▶ 結球初期から発病
- ▶ 下葉の基部に水浸状病斑
- ▶ 白い綿毛状のかび
- ▶ ネズミ糞状の菌核

多発条件

- ▶ 過湿
- ▶ 前作発病した圃場
- ▶ 軟弱徒長

今月のおすすめローテーション

対象病害虫によって使用倍率が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。

順番	RAC	対象病害	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数
①	2	菌核病・株腐病 予	ロブラール水和剤	1,000倍	7日前	4回
②	7,11	菌核病・株腐病 黒斑病・べと病 予・治	シグナムWDG※	1,500倍 (べと病:1,500~2,000倍)	7日間	2回
③	40,49	べと病	オロンディスウルトラS C	2,000倍	7日前	2回
④	U17	べと病・ピシウム腐敗病 予・治	ピシロックフロアブル	1,000倍	前日	3回
⑤	12	菌核病・株腐病 予	セイビアーフロアブル20	1,000倍	前日	3回

チョウ目害虫にお困りの場合は...

※シグナムWDGはカンタスDFと合わせて2回

RAC	対象害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数
5	コガ・オタバコガ・ハモエトウ・アムシ 等	ディアナSC	2,500~5,000倍	前日	2回
6	コガ・アムシ・ハマダラメカイ 等	アファーム乳剤	1,000~2,000倍	前日	3回
15	コガ・アムシ 等	アクセルフロアブル	1,000倍	前日	3回
	ハモエトウ・オタバコガ 等		1,000~2,000倍		
23	コガ・アブラムシ類・アザミヤカ類・アムシ	モベントフロアブル	2,000~4,000倍 (アザミヤカ類・アムシ:2,000倍)	7日前	3回
30	シイデジヨウ・コガ ハモエトウ・オタバコガ 等	ブロフレアSC	2,000~4,000倍	前日	3回
	コガ・オタバコガ・シイデジヨウ 等	グレーシア乳剤	2,000~3,000倍	7日前	2回

ファイトマジック

1,000倍 葉面散布

キレートマグネシウム+各種微量元素

- ★葉にテリ・ツヤ・厚みUP！
- ★日照不良時の代謝の向上！

肥料登録
生第87201号



ファイトカル

1,000倍 葉面散布

- ★有機酸とトレハロースによるWキレートカルシウム
- ★優れた展着性・浸透性
- ★チップバーン対策におすすめ アミスター、無機銅、ホルモン剤
液肥類との混用不可

肥料登録
生第83188号

