



ミニトマト編

病害虫注意報 2024年12月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

低温期対策特集

疫病

- 葉や果実が黒色に近い色で水浸状になる病気。
- 症状が進行すると、病斑に汚白色のかびが発生する。
- 施設栽培では、低温期の多湿な圃場で発生しやすい。
- 結露が多い時期は時に注意が必要。
- 病原菌の適温は20℃前後

【耕種的防除】

- 罹病株の早期除去、圃場外への処理
- 結露や多湿条件を減らす環境制御
- 水はけの良い土壌環境を整える
- 露地栽培は、雨除けやマルチの使用



灰色かび病

- 被害部が褐変し、灰色のかびを生じる。
- 咲き終わった花卉やぐく、果実に発生しやすい。
- 病勢が激しいと株全体が枯死する。
- 20℃前後+湿度95%以上の環境が8時間以上継続すると多発の可能性あり。

【耕種的防除】

- 罹病株の早期除去、圃場外への処理
- 栽培時期に適した肥培管理
- 循環扇による温度、湿度のムラ抑制
- モヤコンを使用した定期的な除湿



今月のおすすめローテーション

対象病害虫によって希釈倍数が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。

時期	RAC	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数	影響日数 マルハナバチ
12月①	49, 40	疫病	オロンディスウルトラSC	2,000倍	前日	2回	—
	—	コナジラミが多い場合	フーモン※	1,000倍	前日	—	0日
12月②	M01	疫病・葉かび病 すすかび病 等	兼商クプロシールド	1,000倍 (疫病1,000~2,000倍)	—	—	1日(如)
	6	コナジラミが多い場合	アフーム乳剤	2,000倍	前日	5回	2日
12月③	7	灰色かび病・葉かび病 うどんこ病 等	ネクスターフロアブル	1,000倍	前日	3回	1日
	23	コナジラミが多い場合	クリアザールフロアブル	2,000~4,000倍	前日	2回	1日

※野菜類登録

リダバイタル

テンサイ糖蜜含有 植物性アミノ酸配合

低温障害を軽減

光合成促進

葉菜類登録 葉面散布 500~1,000倍



おすすめ資材 NEW-SB酸素

☆根張り促進や

成り疲れ防止に灌水
処理がお勧め!

5~10kg/10a
7~10日おき灌水処理

酸欠を防ぎ
根の動きを促す!!

