



# イチゴ編

## 病害虫注意報 2025年1月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

春先の病害虫蔓延を防ぐために 定期的な防除を心がけましょう！



# 収穫中 おすすめローテーション



対象病害虫によって希釈倍数が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。

時期	RAC	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数	影響日数			
							ミツバチ	マルハナ	ミカ	刊
1月 ③	11	炭疽病 灰色かび病	<b>予・治</b> ファンタジスタ 顆粒水和剤	2,000~3,000倍 (炭疽病: 2,000倍)	前日	3回	1日		0日	
	-	うどんこ病・コナジラミ類 ハダニ類・アブラムシ類	フーモン ※野菜類登録	1,000倍	前日	-	0日		1日	
<b>天敵導入</b>										
2月 ①	7,11	うどんこ病・炭疽病 灰色かび病	<b>予・治</b> シグナムWDG	2,000倍 灰色かび病: 1,500~2,000倍	前日	2回	0日	-	0日	-
	34	アザミマ類	ファインセーブ フロアブル	1,000~2,000倍	前日	3回	1日		0日	
2月 ②	9	うどんこ病 灰色かび病	<b>予・治</b> フルピカフロアブル	2,000~3,000倍	前日	3回	0日		0日	
	15	アザミマ類 ハスモンヨトウ	マッチ乳剤	1,000~2,000倍 ハスモンヨトウ: 3,000倍	前日	4回	1日	0日	0日	

### 根張り改善に!

## ファイトメット

100~150g/10aまたは  
2,000~3,000倍灌水

根張りが悪くなる冬期・収穫期  
新しい根を出すチカラを!!

▶毛細根の充実に!

▶リン酸・ミネラル分の吸収UP!



肥料登録  
輸第84050号

### トップバーン対策に!

## ファイトカル

1,000倍 葉面散布

優れた展着性と浸透性!  
ケリンパタイン配合!  
軟弱果対策にも  
おすすめです!

アミスター、無機銅、ホルモン剤  
液肥類との混用は出来ません



肥料登録  
生第83188号

### おすすめ資材

酸欠を防ぎ根の動きを促す!

## NEW-SB酸素

根張り促進や成り疲れ  
防止に灌水処理が  
お勧め!

10kg/10a

7~14日おき灌水処理

