



# キュウリ編 天敵導入版



## 病害虫注意報 2025年2月号

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

**春にかけてアザミウマ類の発生が多くなる時期です。  
発生を確認したら密度の低いうちに防除しましょう。**

### 天敵 スワルスキー



【野菜類での使用量】250～500ml  
(25,000～50,000頭)/10a

- 定着性に優れる！
- 成虫は捕食できない。
- **密度を低く抑えてから放飼することがポイント。**

※天敵導入前後の薬剤散布は、天敵に影響の少ない薬剤を確認して使用してください。

### スワルスキープラスUMもお勧め



【使用量】  
100～200パック/10a  
(25,000～50,000頭/10a)

- 増殖施設とも言えるパックに守られている。
- **パック内の天敵の増殖力が向上。**

※作物全体への分散に時間を要するため、早めの放飼をお勧めします。

## 今月のおすすめローテーション

天敵導入される方向けです！  
導入されない方は別紙をご覧ください。

時期	RAC	適用病害虫	薬剤名・使用量など
2月 ①	-	アザミウマ類 コジラミ類 チャホリダニ	<b>【天敵】スワルスキー or スワルスキープラスUM</b> 250～500ml/10a or 100～200パック/10a(約25,000～50,000頭) 発生直前～発生初期 野菜類登録

天敵放飼7～10日間後

時期	RAC	適用病害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数	影響日数 スワルスキー
2月 ②	27, 40	べと病 <b>予・治</b>	ベトファイター顆粒水和剤	2,000～3,000倍	前日	3回	-
	28	アザミウマ類・コジラミ類 アブラムシ類 等	ベネビアOD	2,000倍	前日	3回	0日
2月 ③	7	灰色かび病・菌核病 つる枯病・うどんこ病 褐斑病 <b>予・治</b>	ケンジャフロアブル	1,000～1,500倍 (つる枯病、うどんこ病、褐斑病 1,500倍)	前日	4回	0日
	4A	ミミズアザミウマ コジラミ類 等	ベストガード水溶剤	1,000～2,000倍	前日	3回	-

対象病害虫によって希釈倍数が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。

### ガイア蘇生

**成り疲れ対策！**

10～14日に1回  
1kg/10a灌注

- ・静菌・静虫作用
- ・側根誘導

毛細根の発達により  
成り疲れを予防



規格：20kg

### おすすめ資材

## NEW-SB酸素

- ☆ 土壌に酸素を供給し、根の活動を活発に！
- ☆ 肥料・葉面散布剤の吸収を良くします！

**混入機：10kg/10a**

**動噴：100倍**

