



イチゴ編

病害虫注意報 2025年5月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。



苗から本圃への病害虫持ち込みを防ぐためにも 親株床から徹底防除に努めましょう！



親株おすすめローテーション

対象病害虫によって希釈倍数が異なる場合があります。
ラベルの確認をしてから使用してください。

| 時期 | 対象病害虫 | 薬剤名 | 希釈倍数 | 使用時期 | 回数 | 影響日数 | | | |
|---------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|----|---------------|------|------|-----|
| | | | | | | ミツバチ | マルハナ | ミカ | 刊 |
| 5月 ③ | 炭疽病 じゃのめ病 | ジマンダイセン水和剤 | 600倍 | 仮植栽培期 (76日前) | 6回 | 3日 | 0日 | 14日 | |
| | アブラムシ類 ハダニ類 | ロディー乳剤 | 1,000~ 2,000倍 | 前日 | 3回 | 開花中は 使用しない | | 60日↑ | 84日 |
| 5月 ④ | 炭疽病 | ゲッター水和剤 | 1,000倍 | 21日前 | 3回 | 0日 | 1日 | 14日 | |
| | うどんこ病 ハダニ類 等 | フーモン ※野菜類登録 | 1,000倍 | 前日 | - | 0日 | | 1日 | |
| 6月 ① | 炭疽病 等 | アミスター20 フロアブル | 2,000倍 | 親株育成期 | 3回 | 0日 | 1日 | 0日 | |
| | ハダニ類 等 | トクチオン乳剤 | 1,000倍 | 75日前 | 3回 | - | 1日 | 30日 | |
| 6月 ② | 炭疽病 じゃのめ病 | ジマンダイセン水和剤 | 600倍 | 仮植栽培期 (76日前) | 6回 | 3日 | 0日 | 14日 | |
| | ハダニ類 | アグリメック | 500~ 1,000倍 | 親株育成期 | 2回 | 14日 | 7日 | 7日 | |

高温対策に！

効果の持続は約3か月
放出量は2倍

すずみどりXL

香り成分で、葉焼けや
萎れ等の高温障害を予防！
更に光合成を向上

ハウス内に吊るすだけ
10~20本/10a

※手で折り曲げてから
吊るしてください



光合成能力UP!

ファイトオーツ

どぶ漬け 1,000倍
葉面散布1,000倍 7~10日おき散布
植物本来の力を活性化☆

▶活着の改善 ▶抵抗性誘導物質の向上
▶毛細根の充実



肥料登録
生第83241号