



トマト編

病害虫注意報 2025年5月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

天窓・側窓を開放する時間が増えると、コナジラミ類の侵入も増えます。
コナジラミ類によって伝搬するウイルス病は、減収に影響します。
物理的・化学的防除を組み合わせる栽培終盤も乗り切りましょう。



黄化葉巻病(TYLCV)



新葉が黄化・萎縮し、
葉巻症状を呈する。
進行すると節間が短くなり
株まで萎縮する。
重度になると、着果不良に
なる。

耐病性品種は症状が分
かりにくい場合があります。

黄化病(ToCV)



初期は下位葉の葉脈間の
黄化が発生し、上位葉へ
も広がる。
葉脈間の症状は、徐々に
えそ症状を伴う。
これはマグネシウム欠乏に
類似していると言われる。

今月のおすすめローテーション

対象病害虫によって希釈倍数が異なる場合があります。
ラベルの確認をしてから使用してください。

時期	RAC コード	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	使用 時期	回数	影響日数 マルハバチ
5月 ①	11	灰色かび病・葉かび病 すすかび病 等	ファンタジスタ顆粒水和剤	2,000～3,000倍	前日	3回	0日
	9B	アブラムシ類 コナジラミ類	チェス顆粒水和剤	5,000倍	前日	3回	0日
5月 ②	U06,3	うどんこ病	パンチョTF顆粒水和剤	2,000倍	前日	2回	0日
	4A	コナジラミ類・アブラムシ類	バリアード顆粒水和剤	2,000～4,000倍	前日	3回	1日
5月 ③	7	灰色かび病 葉かび病・菌核病	カンタスドライフロアブル	1,000～1,500倍	前日	3回	0日
	6	ミカンキイロアザミウマ コナジラミ類 等	アニキ乳剤	1,000～2,000倍	前日	3回	1日

高温対策に！ 効果の持続は約3か月
放出量は2倍

すずみどりXL

香り成分で、葉焼けや
萎れ等の高温障害を予防！
更に光合成を向上

ハウス内に吊るすだけ
10～20本/10a

※手で折り曲げてから
吊るしてください



ダブルシューターSE

1,000倍
前日/2回/マルハバチ3日

ハダニ類・コナジラミ類・ハメグリハエ類
アザミウマ類・オオハバコガ・トモミバガ
コナジラミ類対策におすすめの1剤!!

