



スイカ編

病害虫注意報 2025年5月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

つる枯病、アブラムシ類、コナジラミ類の発生にご注意ください！

おすすめ防除ローテーション

交配後2週間は農薬散布を避けましょう!

時期	RAC	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数	影響日数 ミツバチ
①	M03	つる枯病・べと病 炭疽病 等	予 ジマンダイセン水和剤	400~600倍	7日前	7回	3日
	23	アブラムシ類・コナジラミ類 アザミウマ類・ハダニ類	モベントフロアブル	2,000倍	前日	3回	1日
②	3	つる枯病・炭疽病 うどんこ病	予・治 スコア顆粒水和剤	2,000倍	前日	3回	1日
	4A	アブラムシ類・アザミウマ類 コナジラミ類 等	モスピラン顆粒水溶剤	2,000~4,000倍 (コナジラミ類: 2,000倍)	3日前	3回	1日
③	11	つる枯病・炭疽病 菌核病	予 スクレアフロアブル	2,000倍	前日	3回	1日
	4C	アブラムシ類・コナジラミ類	トランスフォームフロアブル	1,000~2,000倍 (アブラムシ類: 2,000倍)	前日	3回	10日
④	M07	つる枯病・炭疽病 うどんこ病・菌核病	予 ベルクート水和剤	1,000倍	前日	4回	0日
	29	アブラムシ類	ウララDF	2,000~4,000倍	前日	2回	0日

その他病害虫 おすすめ薬剤

対象病害虫	RAC	薬剤名	希釈倍数	時期	回数	影響日数 ミツバチ
ハダニ類	6	アグリメック	500~1,000倍	前日	3回	14日
	20B	カネマイトフロアブル	1,000~1,500倍	前日	1回	1日
	25A	スターマイトフロアブル	2,000倍	前日	1回	1日
果実汚斑細菌病	24,M01	予・治 カッパーシン水和剤	1,000倍	前日	5回	0日
うどんこ病	3,U06	パンチョTF顆粒水和剤	2,000倍	前日	2回	0日
	7,11	予・治 シグナムWDG	1,500~2,000倍	前日	3回	0日

カテキンパワーUP↑

「カテキンパワー」がパワーアップしてリニューアル!!

成分などの見直しで、**抗菌力・使いやすさ・コスパがUP!!**

成分: カテキン類 野菜類使用例: 500倍 1~2週間ごとに葉面散布
内容量: 1リットル 肥効: 樹勢回復、活着促進、生育増進

Point!

茶抽出物の選抜
で抗菌力が向上

水に溶けやすくなり、
散布しやすい

原材料などの見直し
で値下げを実現

