



イノチオ防除チラシ
2025年7月号

スイカ

inochio
GROUP

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

収穫前防除 ～ハダニ類・コナジラミ類対策～

ナミハダニ



大きさは約0.6mm。最適温度は20～28℃、乾燥条件で多発しやすく、**圃場周辺の雑草で多発するので注意**。葉裏に生息していることが多い。葉に小さいカスリ状の白斑を生じる。

冬			春			夏			秋		
1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月

タバココナジラミ



大きさは約0.8mm。最適温度は25～30℃。排泄物が付着した葉や果実に**すす病が発生すると商品価値が下がってしまう**。

作物によっては、ウイルスを媒介する危険がある。すす病(ナス)



冬			春			夏			秋		
1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月

IRAC	対象害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数	影響日数	
						ミツバチ	マルハナ
4A	アブラムシ類	アルバリン顆粒水溶剤	2,000～3,000倍	7日前	2回	14日	14日 (加22日)
4A	アブラムシ類・コナジラミ類 ミナミキイロアザミウマ	ベストガード水溶剤	1,000～2,000倍	7日前	3回	6日	10日
4C	アブラムシ類・コナジラミ類	トランスフォームフロアブル	1,000～2,000倍 (アブラムシ類:2,000倍)	前日	3回	10日	2～5日
5	コナジラミ類・アザミウマ類、 ウリノメイガ・オオタバコガ・ハスモンヨトウ	ディアナSC	2,500～5,000倍 (コナジラミ類:2,500倍)	前日	2回	3日	1日
6	コナジラミ類・アザミウマ類	アフーム乳剤	1,000～2,000倍 (コナジラミ類:2,000倍)	前日	3回	2日	2日
9B	アブラムシ類・コナジラミ類	コルト顆粒水和剤	4,000倍	前日	3回	訪飼 不可	7日

+ 病害対策はこちら！

対象病害虫によって希釈倍率が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。

FRAC	対象病害	薬剤名	予防	治療	希釈倍数	使用時期	回数	影響日数	
								ミツバチ	マルハナ
M03	炭疽病・つる枯病	アントラコール顆粒水和剤	○	—	400～600倍	前日	4回	—	1日
7	うどんこ病・菌核病 つる枯病	アフエットフロアブル	○	—	2,000倍	前日	3回	0日	1日

資材消毒していますか？

剪定用のハサミなどの資材に菌が付着すると、植物の傷口から伝染させてしまう可能性があります。大切な作物に病原菌を感染させないよう、収穫時にも資材消毒がおすすめです！



ケミクロンG

500～1000倍希釈
(使用目的により異なる)
育苗箱・育苗ポット
剪定用ハサミ・収穫用かご
など 資材の消毒
※消毒後、水洗する



カテキンパワーUP↑Point!

「カテキンパワー」がパワーアップしてリニューアル!!

成分などの見直しで、**抗菌力・使いやすさがUP!!**

成分：カテキン類 内容量：1リットル

野菜類使用例：500倍 1～2週間ごとに葉面散布

肥効：樹勢回復、活着促進、生育増進

茶抽出物の選抜
で抗菌力が向上

水に溶けやすくなり、
散布しやすい



毎月1日掲載
各作物をチェック！

