イノチオ防除チラシ
2025年8月号

ハクサイ

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

育苗期～定植時おすすめ防除

薬剤名	ミネクトデュオ粒剤	ベリマークSC	兼商ヨーバルフロアブル
IRAC	28,4A	28	28
適用害虫	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類・ｺﾅｶﾞ・ｶﾌﾞﾗﾊﾊﾞﾁ ｷｽｼﾞﾉﾐﾊﾑｼ・ﾊｲﾏﾀﾞﾗﾉﾒｲｶﾞ・ｱｵﾑｼ	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類・ｺﾅｶﾞ・ｶﾌﾞﾗﾊﾊﾞﾁ類・ｱｵﾑｼ ｷｽｼﾞﾉﾐﾊﾑｼ・ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ・ｼﾛｲﾁﾓｼﾞﾖﾄｳ	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類・ｺﾅｶﾞ・ﾊｲﾏﾀﾞﾗﾉﾒｲｶﾞ ﾈｷﾘﾑｼ類・ﾖﾄｳﾑｼ・ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ・ｱｵﾑｼ
希釈倍率 使用量	セルトレイ1箱あたり40g	400倍 (セルトレイ1箱あたり0.5L)	200倍 (セルトレイ1箱あたり0.5L)
使用方法	散布	灌注	灌注
使用時期	は種覆土後～育苗期後半	育苗期後半～定植当日	育苗期後半～定植当日
使用回数	1回	1回	1回

⚠ ミネクトデュオ粒剤を使用した場合、下記の薬剤は苗場での使用ができません!! ⚠
ベリマークSC・ベネビアOD・アクタラ粒剤5・ジュリボフロアブル・プリロッソ粒剤オメガ・アベイル粒剤・アクタラ顆粒水溶剤

対象病害虫によって希釈倍率が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。

前作に病気や雑草でお困りの方は土壌消毒が有効です！

効果を上げるポイント!

①砕土を丁寧に行う
→固まっている土の内部は消毒されません！

②被覆を必ず行う
→被覆を行わないと薬剤が抜けやすくなり、
表層しか消毒できません！

バスアミド®
微粒剤
黄化病・根くびれ病・根こぶ病・尻腐病
ネコブセンチュウ・一年生雑草
20～30kg/10a　は種又は定植21日前まで / 1回
所定量を均一に散布して土壌と混和する

苗の徒長対策におすすめ！

このような症状には注意！
・植物の元気がない
・葉色が薄い
・葉と葉の間隔が長い
・自力で立てない

エレマックス赤 0-28-26
軟弱徒長株を強く！ 1,000倍 葉面散布
▶樹を締めて徒長防止！
▶病害抵抗力の向上に！
肥料登録:
輸第9423号

◎石灰硫黄合剤、アルカリ性農薬、銅剤、液肥、ホルモン剤との混用は避ける。
※カテキンパワーとの混用は可能です

マグマSi
吸収性の高い水溶性ケイ酸資材
▶ 細胞壁の強化
▶ 高温・低温への抵抗性
▶ 耐病性の向上
▶ 成長促進・抑制のコントロール

〈葉面散布〉
育苗期2,000（春夏）
成長期5,000～10,000倍
〈潅水〉
原液100～200ml／反
倍率コントロール 20,000～50,000倍

フルボディ
定植ストレスを軽減・活着促進!
▶ 腐植酸(フルボ酸・フミン酸)
→土壌の団粒化
▶ 海藻抽出成分
→根の伸長促進

1000～2000倍
500ml/セルトレイ 潅注
定植前