

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

**防除チラシ掲載農薬は年間の通し回数をカウントしていません！
ご自身の散布履歴に合わせて薬剤を検討してください！**

灌注剤を上手に使って作物を病害虫から守りましょう！

おすすめ 薬剤	ピシロックフロアブル	ランマンフロアブル	モベントフロアブル	ベリマークSC
RACコード	U17	21	23	28
適用病害	疫病	疫病	うどんこ病 アブラムシ類・コナジラミ類 アザミウマ類・チャノホリダニ ハダニ類・カバネノコバエ類	アブラムシ類・コナジラミ類 アザミウマ類・ハスモンヨトウ コガネムシ類・カバネノコバエ
希釈倍率	500倍	500～1,000倍	250倍 (うどんこ病：500倍)	1,000倍
使用液量	50～100mL/株	100mL/株	25mL/株 (うどんこ病：50mL/株)	50mL/株 (アブラムシ類：25～50mL/株)
使用時期	開花前まで	生育期 (但し、収穫30日前まで)	育苗期後半～定植当日	育苗期後半～定植当日
使用回数	2回	2回以内	1回	1回

対象病害虫によって希釈倍率が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。

定植時～定植後 おすすめ防除

IRAC FRAC	対象病害虫	薬剤名	予防	治療	希釈倍数	使用時期	回数	影響日数			
								ミツバチ	マルハナ	ミヤコ	チリ
10,1	炭疽病	ゲッター水和剤	○	○	1,000倍	収穫開始 21日前	3回	0日	1日	14日	
13	ミカンハダアザミウマ ハダニ類・ハスモンヨトウ シクモホリダニ	コテツフロアブル	—	—	2,000倍	前日	2回	10日	9日	14日	
M04	灰色かび病 炭疽病・芽枯病	オーソサイド水和剤80	○	—	800倍	収穫開始 14日前	5回	1日	0日	0日	
9B	アブラムシ類・コナジラミ類	コルト顆粒水和剤	—	—	3,000～4,000倍	前日	3回	放飼 不可	7日		
M07	灰色かび病・炭疽病 黒斑病・うどんこ病※	ベルコートフロアブル	○	—	2,000倍 (※2,000～4,000倍)	前日 (生育期)	5回	0日		0日	
21A	ハダニ類・チャノホリダニ※	ダニトロンフロアブル	—	—	1,000～2,000倍 (※1,000倍)	前日	1回	1日	14日	14日 以上	
3	うどんこ病・炭疽病※	サンリット水和剤	○	○	2,000～4,000倍 (※2,000倍)	前日	3回	1日	—	0日	—
6	ハダニ類・オオタバコガ ハスモンヨトウ・ヨトウムシ	アフーム乳剤	—	—	2,000倍	前日	2回	2日		7日	