



イノチオ防除チラシ
2025年9月号

ナス

inochio
GROUP

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

コナジラミ類・黒枯病対策



この症状はどんな病気？～黒枯病～

【黒枯病(*Corynespora cassiicola*)】

主に葉に発生するが、多発すると茎や果実にも発生。初めは**紫褐色～黒色の円形**の病斑を生じ、拡大すると不整形の病斑となる。古い病斑は、周辺が黒紫色に、中央は灰褐色に色あせ、同心円状の輪紋を生じる。多発すると落葉し、生育抑制が起こる。

茎では**収穫や整枝による切り口**から発病、枝枯れする。枯死した茎の表面には、暗黒色のカビを生じる。果実では、赤褐色～褐色のくぼみや、**表面に無数の小隆起**を生じ、湾曲することが多い。

気温が下がりはじめ、多湿条件になりやすい**9月下旬**から発生が増加するので注意！



FRAC	対象病害	薬剤名	予防	治療	希釈倍数	使用時期	回数	影響日数	
								ミツバチ	マルハナ
7	うどんこ病・菌核病・黒枯病 すすかび病・灰色かび病	ケンジャフロアブル	○	○	1,500倍	前日	3回	1日	1日
9	うどんこ病・黒枯病 灰色かび病	フルピカフロアブル	○	○	2,000～3,000倍	前日	4回	0日	0日
7	うどんこ病・すすかび病・菌核病 褐色円星病・褐色斑点病 灰色かび病	アフエットフロアブル	○	△	2,000倍	前日	3回	0日	1日

対象病害虫によって希釈倍率が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。

+ コナジラミ類対策にはこちら！

IRAC	対象害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数	影響日数	
						ミツバチ	マルハナ
6	コナジラミ類・アザミウマ類・ハダニ類 ハモグリバエ類・オオタバコガ ハスモンヨトウ・チャノホリタガニ	アフーム乳剤	2,000倍	前日	2回	2日	2日
23	アブラムシ類・コナジラミ類・ハダニ類 アザミウマ類・コナカイガラムシ類 チャノホリタガニ	モベントフロアブル	2,000倍	前日	3回	1日	30日
28	アブラムシ類・コナジラミ類 アザミウマ類・ハモグリバエ類 オオタバコガ・ハスモンヨトウ	兼商ヨーバルフロアブル	2,500～5,000倍 (コナジラミ類・アザミウマ類: 2,500倍)	前日	3回	14日	14日(加)
UN M10	コナジラミ類・チャノホリタガニ うどんこ病・すすかび病	パルミノ	2,000倍	前日	3回	5日	1日(加)
4A	アブラムシ類・カメムシ類 コナジラミ類・アザミウマ類	アルバリン顆粒水溶剤	2,000倍 (アブラムシ類:3,000倍 コナジラミ類:2,000～3,000倍)	前日	2回	14日	14日 (加 22日)

ダブルシューターSE

- ✓ 感受性が低下したハダニ類、アザミウマ類にも有効！
- ✓ コナジラミ類の全ステージに優れた効果！

コナジラミ類・アザミウマ類・ハダニ類・ハモグリバエ類・オオタバコガ
1,000倍 / 前日 / **2回** / 影響日数ミツバチ2日・マルハナバチ3日

※使用回数のカウントに注意！スピノエース顆粒水和剤と同じ有効成分を含みます！



毎月1日掲載
各作物をチェック！

