



イノチオ防除チラシ
2025年9月号

レタス

inochio
GROUP

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

育苗期～定植時おすすめ防除

ベリマークSC



害虫対策

28
アブラムシ類・ウバ類・コナギ類 ハダニ類・オオタバコガ・ハスモンヨトウ シロイモシヨトウ・ヒメフタネコバエ
400倍
灌注
育苗期後半～定植当日 (コナギ類:定植当日)
1回

IRAC

対象
病害虫

使用量

使用方法

使用時期

使用回数

細菌病対策

P02
斑点細菌病・腐敗病
6～9kg/10a
土壌混和
定植時
1回

オリゼメート粒剤



対象病害虫によって希釈倍率が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。

IRAC FRAC	対象害虫	薬剤名	希釈倍数	使用 時期	回数
7	菌核病・すそ枯病・灰色かび病	カナメフロアブル※	4,000倍	前日	3回
U18	すそ枯病・軟腐病・腐敗病	バリダシン液剤5	800倍	前日	3回
11	菌核病・すそ枯病・灰色かび病	ファンタジスタ顆粒水和剤	2,000～3,000倍 (すそ枯れ病:2,000倍)	3日前	3回
31	軟腐病・斑点細菌病・腐敗病	スターナ水和剤	2,000倍	7日前	2回
28	アブラムシ類・ウバ類・ハダニ類 オオタバコガ・ヨウムシ・ハスモンヨトウ	兼商ヨーバルフロアブル	2,500～5,000倍	前日	3回
23	アザミウマ類・アブラムシ類	モベントフロアブル	2,000倍 (アブラムシ類:2,000～4,000倍)	7日前	3回

※レタス類登録

フルボディ

腐植酸(フルボ酸・フミン酸)→土壌の団粒化
海藻抽出成分配合→根の伸長促進



定植ストレスを軽減・活着促進！

葉菜類使用例 500ml/セルトレイ 灌注 定植前



クロスバリュー

2種類の微生物の力で

- 環境ストレスへの耐性強化
- 収量や品質の安定化

野菜類使用例

500～1,000倍、50～100ml/株
定植時～定植後、株元灌注

