イノチオ防除チラシ
2025年9月号

イチゴ

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

高温時対策　おすすめ資材

海のチカラを植物へ。
マリンインパクト
海藻抽出物100%使用

◆成り疲れ対策にも効果抜群!
◆菌根菌との共生アップ
◆長期取り作物のストレス対策に

500～1,000倍
〈定植直後〉2週間おき2~3回
〈着果・果実充実〉2週間おき2~4回

高温ストレス軽減
炎天マスター
高温耐性のスイッチON!

◆高温対策専用バイオスティミュラント剤
◆高温に備える指令を伝える遺伝子の発現増加
◆ストレスによって植物を傷つける物質の除去

500~1,000倍
7~14日間隔 葉面散布

広がる根、実る価値。
クロスバリュー
2種類の微生物で根を活性化!

◆環境ストレスへの耐性強化
◆収量や品質の安定化

野菜類使用例
500～1,000倍、50～100ml/株
定植時～定植後、株元灌注

植物が活き活きと踊り出す!
海藻サンバ
より赤く!より甘く!より鮮やかに!

◆コリンによる光合成促進と発根促進
◆海藻エキスによる発根促進

育苗期・生育期
1,000倍

防除チラシ掲載農薬は年間の通し回数をカウントしていません！
ご自身の散布履歴に合わせて薬剤を検討してください！

IRAC FRAC	対象病害虫	薬剤名	予防	治療	希釈倍数	使用時期	回数	影響日数 ミツバチ	マルハナ	ミヤコ	チリ
12	黒腐病・炭疽病 灰色かび病	セイビアーフロアブル20	○	–	1,000倍 (灰色かび病: 1,000～1,500倍)	前日	3回	0日		0日	
28	ｺﾅｼﾞﾗﾐ類・ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ	兼商ヨーバルフロアブル	–	–	2,500～5,000倍 (ｺﾅｼﾞﾗﾐ類:2,500倍)	前日	2回	14日	14日 (クロ)	1日	
7	うどんこ病・輪斑病 黒色根腐病 灰色かび病	アフェットフロアブル	○	△	2,000倍	前日	3回	0日	1日	0日	
21A	ﾜﾀｱﾌﾞﾗﾑｼ・ｺﾅｼﾞﾗﾐ類 ﾊﾀﾞﾆ類・ﾁｬﾉﾎｺﾘﾀﾞﾆ ｼｸﾗﾒﾝﾎｺﾘﾀﾞﾆ	サンマイトフロアブル	–	–	1,000～1,500倍	収穫開始 3日前	1回	4日	1～4 日	30日	
10,1	炭疽病	ゲッター水和剤	○	○	1000倍	収穫開始 21日前	3回	0日	1日	14日	
6	ﾊﾀﾞﾆ類・ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ ﾖﾄｳﾑｼ・ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ	アファーム乳剤	–	–	2,000倍	前日	2回	2日	2日	7日	
11,7	うどんこ病・炭疽病 灰色かび病	シグナムWDG	○	○	2,000倍 (灰色かび病: 1,500～2,000倍)	前日	2回	0日	–	0日	–
23	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類・ｺﾅｼﾞﾗﾐ類 ｱｻﾞﾐｳﾏ類	モベントフロアブル	–	–	2,000倍	前日	3回	1日	30日	35日	

作物によって対象病害虫や希釈倍率が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。