



イノチオ防除チラシ
2025年10月号

ナス

inochio
GROUP

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

アザミウマ類・オオタバコガ対策

アザミウマ類



大きさは約1~2mm。細長く、小さいため見つけにくい。スリップスとも呼ばれる。新芽、新葉、花などを吸汁し、**葉の萎縮や奇形、花の褐変**を生じる。吸汁痕はカスリ状になり、銀色に見えることから、**シルバリング**と呼ばれる。

多発すると、**果皮に茶褐色で筋状の食害痕**を生じ、品質低下につながる。

黄化えそ病は、ミナキイロアザミウマやミカンキイロアザミウマによって媒介される。



オオタバコガ



若齢幼虫は新葉を食害し、円形または楕円形の孔をあける。中・老齢幼虫は茎や脇芽の内部へ侵入し、**新鞘の先端が折れる**。花や幼果を食害し、**果実に侵入する**ため品質低下を招く。**内部に潜り込んでしまうと防除が難しくなる。**

卵は1つずつ産卵するので集団での加害は少ないが、1頭の幼虫が渡り歩いて食害するため、寄生数が少なくても被害は拡大する。

IRAC FRAC	対象病害虫	薬剤名	予防	治療	希釈倍数	使用時期	回数
7	うどんこ病・褐色斑点病・菌核病 黒枯病・すすかび病・灰色かび病	ネクスターフロアブル	○	—	1,000倍	前日	3回
30	コナジラミ類・アザミウマ類・ハダニ類 ハモグリバエ類・オオタバコガ ハモシヨウ・チャノコリダニ	グレース乳剤※	—	—	2,000倍	前日	2回
12	褐色斑点病・灰色かび病 フザリウム立枯病	セイビアーフロアブル20	○	—	1,000~1,500倍 (褐色斑点病:1,500倍、 フザリウム立枯病:1,000倍)	前日	3回
6	コナジラミ類・アザミウマ類・ハダニ類	アグリメック	—	—	500~1,000倍	前日	3回
3	うどんこ病・すすかび病	ラリー水和剤	○	○	4,000~6,000倍	前日	4回
34	タバココナジラミ類(シルバーリーフコナジラミを含む) アザミウマ類	ファインセーブフロアブル	—	—	1,000~2,000倍 (タバココナジラミ類:1,000倍)	前日	3回
11,7	うどんこ病・褐色斑点病・褐紋病 菌核病・すすかび病・灰色かび病	シグナムWDG	○	○	1,500倍 (すすかび病: 1,500~2,000倍)	前日	3回
13	ミカンキイロアザミウマ・ミナキイロアザミウマ テントウムシダマシ類・ハダニ類・オオタバコガ ヨトウムシ・ハモシヨウ・チャノコリダニ	コテツフロアブル	—	—	2,000倍	前日	4回

※水なす及び賀茂なすの果実には薬害を生じるので、使用しないでください。

置型しなもん

温風加温器の吹出口付近に置くだけ！
散布する手間がかかりません

有効成分はシナモンの主成分と同じ
使用回数制限無し
ハチや天敵への影響少ない

すすかび病 30ml/10a/日



フルボディ

腐植酸(フルボ酸・フミン酸)→土壌の団粒化
海藻抽出成分配合→根の伸長促進



定植ストレスを軽減・活着促進！

葉菜類使用例 500ml/セルトレイ 灌注 定植前

