



イノチオ防除チラシ
2025年10月号

レタス

inochio
GROUP

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

チョウ目・アブラムシ類対策

<p>アブラムシ類</p> 	<p>ハスモンヨトウ</p> 	<p>オオタバコガ</p> 
<p>葉裏に1~2mmの虫が群がって吸汁し、葉が黄化して枯れることもある。 レタスの場合、モザイク病を媒介する。 卵ではなく直接幼虫を産むため、短期間に増殖する。9~11月は、モモアカアブラムシとニセダイコンアブラムシの発生が増加する。</p>	<p>頭部のやや後方に1対の黒斑がある。卵は50~200個程の卵塊で、黄土色の鱗毛に覆われている。集団で食害し、葉の表皮を残して白色のカスリ状に食害する。老齢幼虫では葉脈を残して暴食し、被害が大きい。</p>	<p>新葉を食害するため、展開してくる葉が穴だらけになる。芯に潜り込んでしまうと防除が難しくなる。 卵は1つずつ産卵するので集団での加害は少ないが、1頭の幼虫が渡り歩いて食害するため、寄生数が少なくても被害は拡大する。</p>

IRAC FRAC	対象病害虫	薬剤名	予防	治療	希釈倍数	使用時期		回数	
						レタス	非結球	レタス	非結球
4,M05	べと病	フォリオゴールド	○	○	800倍	14日前	リーフレタス 21日前	3回	リーフレタス 2回
9B	アブラムシ類	コルト顆粒水和剤	-	-	3,000~4,000倍	前日	7日前	3回	
7	菌核病・白絹病 すそ枯病・灰色かび病	アフエットフロアブル	○	△	2,000倍	前日		3回	
5	オオタバコガ・ヨトウムシ	スピノエース顆粒水和剤	-	-	2,500~5,000倍 (ヨトウムシ:5,000倍)	3日前	7日前	3回	2回
49,40	べと病	オロンディスウルトラSC	○	○	2,000倍	7日前		2回	
30	アザミウマ類・ハモグリバエ・オオタバコガ ヨトウムシ・ハスモンヨトウ・シロイチモジヨトウ	グレースシア乳剤	-	-	2,000~3,000倍	3日前		2回	
U18	すそ枯病・軟腐病・腐敗病	バリダシン液剤5	○	-	800倍	前日	3日前	3回	
28	アブラムシ類・ウハバチ類・ハモグリバエ類 オオタバコガ・ヨトウムシ・ハスモンヨトウ	兼商ヨーバルフロアブル	-	-	2,500~5,000倍	前日		3回	

対象病害虫によって希釈倍率が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。



N-Catch
エヌキャッチ

野菜類使用例 50aあたり6.25g(1袋)
葉面散布/1~2回/生育初期

窒素固定細菌Gd(グルコンアセトバクター-ジアゾトロフィカス)
葉から植物体内に入り、空中の窒素を供給！
窒素不足時に効果を発揮するため、窒素過多の心配もなし！

酷暑対策に

収穫物の
品質向上に

作物の
生産性向上に



チップバーン予防に!!

ファイトカル

1,000倍 10~14日おきに葉面散布

- ▶ 優れた展着性・浸透性で、葉先までカルシウムを!!
- ▶ 有機酸とトレハロースによるWキレートカルシウム含有

アミスター、無機銅、ホルモン剤、液肥類との混用は出来ません



肥料登録
生第83188号