



イノチオ防除チラシ
2025年11月号

ハクサイ

inochio
GROUP

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

アブラムシ類に注意しましょう!

アブラムシ類



葉裏に1~2mmの虫が群がって吸汁し、葉が黄化して枯れることもある。排泄物にカビが発生し、光合成を妨げて生育抑制を引き起こす。ハクサイの場合、**ウイルス病・モザイク病・えそモザイク病を媒介する**。卵ではなく直接幼虫を産むため、**短期間に増殖**する。9~11月は、モモアカアブラムシとニセダイコンアブラムシの発生が増加する。

アブラムシは単為生殖(クローン)なので、1頭でも短期間で多量に増殖してしまいます。ウイルス病は感染してしまうと治療することはできません。早めにアブラムシ類防除をすることが重要です!



交尾しなくても幼虫を増やせる...(クローン)



IRAC	対象害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数
29	アブラムシ類	ウララDF	2,000~3,000倍	前日	2回
30	ウリバ類・コナガ・ヨトウムシ・ハイマダノメカイ・アオムシ オオタバコガ・アザミウマ類・ハスモンヨトウ・シロイチモジヨトウ	グレース乳剤※1	2,000~3,000倍	7日前	2回
23	アブラムシ類・コナガ	モベントフロアブル	4,000倍	7日前	3回
28	アブラムシ類・コナガ・カブラハバチ類・ハイマダノメカイ オオタバコガ・ヨトウムシ・ハスモンヨトウ・シロイチモジヨトウ・アオムシ	ヨーバルフロアブル	2,500~5,000倍	前日	3回
28	アブラムシ類・コナガ・キスジノミルミシ・ハスモンヨトウ・アオムシ ハイマダノメカイ・ヨトウムシ・シロイチモジヨトウ・ウリバ類	ベネビアOD※2	2,000~4,000倍 (アブラムシ類・キスジノミルミシ :2,000倍)	前日	3回
5	ウリバ類・コナガ・アザミウマ類・ハイマダノメカイ オオタバコガ・ヨトウムシ・ハスモンヨトウ・アオムシ	ディアナSC	2,500~5,000倍	前日	2回
30	コナガ・カブラハバチ類・キスジノミルミシ・ダイコンハムシ・ハスモンヨトウ ハイマダノメカイ・オオタバコガ・ヨトウムシ・シロイチモジヨトウ・アオムシ	ブロフレアSC	2,000~4,000倍	前日	3回
14	アブラムシ類・カタツムリ類・コナガ ナメクジ類・ハイマダノメカイ・アオムシ	リーフガード顆粒水和剤	1,500倍	7日前	3回

※1 結球あぶらな科葉菜類登録

※2 展着剤(まくびか・ミックスパワー・ニーズ)を加用する場合、
外葉の葉裏に褐変・萎縮の症状が発生する場合があるので注意

殺菌剤のおすすめはこちら!

FRAC	対象病害	薬剤名	予防	治療	希釈倍数	使用時期	回数
7	菌核病・尻腐病	カナメフロアブル	○	○	4,000倍	前日	3回
49,40	べと病	オロンディスウルトラSC	○	○	2,000倍	7日前	2回
14	尻腐病	リゾレックス水和剤	○	—	1,000倍	14日前	3回
U18	黒斑細菌病・軟腐病	バリダシン液剤 5	○	△~ ○	500倍	3日前	3回

対象病害虫によって希釈倍率が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。

カテキンパワーUP↑

「カテキンパワー」がパワーアップしてリニューアル!!

成分などの見直しで、**汚れにくくなり使いやすさがUP!!**

成分: カテキン類 内容量: 1リットル

野菜類使用例: 500倍 1~2週間ごとに葉面散布

肥効: 樹勢回復、活着促進、生育増進

Point!

水に溶けやすくなり

汚れにくく、

散布しやすくなりました!



毎月1日掲載
各作物をチェック!

