



イノチオ防除チラシ
2025年11月号

レタス

inochio
GROUP

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

すそ枯病・斑点細菌病 対策




この症状はどんな病気？～すそ枯病・斑点細菌病～

【すそ枯病(*Rhizoctonia solani*)】



外葉の葉柄に、褐色でややへこんだ不定形の病斑を形成する。次第に葉身に広がり葉先から萎れ、褐変し枯れる。一般に結球期以降の発生が多く、外葉が枯れる程度で止まるが、激しい時は結球葉にも及び、全体が腐り、黒色へん平の菌核を形成することもある。菌核は土壤中に生存する。幼苗期に発生すると苗立枯れを起こす。やや低温で雨が多く、土壌湿度が高いと多発する。

【斑点細菌病(*Xanthomonas axonopodis* pv. *vitiensis*)】



外葉に発生が多い。葉縁の近くに水浸状の小斑点を生じ、褐色で不整形の病斑となる。病斑は融合し、葉縁が枯れ込む形となり、葉脈に沿って基部に向かってV字型に枯れ込む。乾くと黒褐色となり、縮むと葉がゆがむ。多湿の状態が続くと。病斑部は軟化して腐敗し、葉全体さらに結球葉にも及ぶことがある。多くの場合は外葉の枯れ込みで終わる。

IRAC FRAC	対象病害虫	薬剤名	予防	治療	希釈倍数	使用時期		回数	
						レタス	非結球	レタス	非結球
2	菌核病・すそ枯病・灰色かび病	ロブラール水和剤	○	—	1,000倍 (灰色かび病:1,000～1,500倍)	14日前	21日前	3回	
7	菌核病・すそ枯病・灰色かび病	カナメフロアブル※	○	○	4,000倍	前日		3回	
11,7	菌核病・すそ枯病 灰色かび病・べと病	シグナムWDG	○	○	1,500倍 (べと病:1,500～2,000倍)	7日前	14日前	2回	
7	菌核病・すそ枯病・灰色かび病	ネクスターフロアブル	○	—	1,000倍	前日	3日前	3回	
31	軟腐病・斑点細菌病・腐敗病	スターナ水和剤	○	—	2,000倍	7日前	14日前	2回	
M01	腐敗病	兼商クプロシールド※	○	—	1,000倍	発病前～ 発病初期		—	
24, M01	斑点細菌病・腐敗病	カッパーシン水和剤	○	○	1,000倍	7日前		4回	

※レタス類登録

+ 害虫対策におすすめはこちら！

IRAC FRAC	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期		回数	
				レタス	非結球	レタス	非結球
6	オオバコガ・ハスモンヨトウ シロイモジヨトウ※非結球登録なし	アニキ乳剤	1,000～2,000倍	3日前	前日	3回	
23	アブラムシ類・アザミウマ類	モベントフロアブル	2,000倍 (アブラムシ類:2,000～4,000倍)	7日前	14日前	3回	
30	オオバコガ・ヨトウムシ・ウバエ類 ハスモンヨトウ・シロイモジヨトウ	ブロフレアSC※	2,000～4,000倍	前日		3回	

対象病害虫や作物によって希釈倍率が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。

※レタス類登録

カテキンパワーUP

「カテキンパワー」がリニューアル!!

成分などの見直しで、
汚れにくくなり使いやすさがUP!!

成分：カテキン類 内容量：1リットル
野菜類使用例 500倍 葉面散布 樹勢回復



白 酢

POINT

- ◆発根を促進し根張りが向上
- ◆固定されたリン酸の吸収を促進
- ◆一時的なpHの抑制

灌注時：100～300倍

散布時：300～1,000倍 ※強酸性のため100倍以下にならないように注意

