



イノチオ防除チラシ
2025年11月号

イチゴ

inochio
GROUP

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

トリオバイタル



チリカブリダニ

- ▶ 特定の種類のハダニのみ捕食する
- ▶ 捕食能力が高く「攻撃型」と呼ばれる
- ▶ 歩行速度が速く、ハダニ密度を素早く減少
- ▶ ハダニの卵を1日に約25～35個も食べる



ミヤコカブリダニ

- ▶ ハダニ類以外のダニ類や、花粉も食べる事ができる
- ▶ ハダニが低密度でも定着、「待ち伏せ型」と呼ばれる
- ▶ 捕食量はやや少ないが、飢餓に強い
- ▶ チリカブリダニよりも乾燥に強い

「攻撃型」のスパイデックスバイタルと
「待ち伏せ型」のスパイカルEXを組み合わせることで、
様々なハダニ発生状況に対応します！
エサ入り製剤なので、活性が高く、定着率が上がり、
より安定した防除効果を発揮します！



スパイデックスバイタル(チリカブリダニ)は
捕食前は白く、捕食後は赤く変化する



ダニの写真提供：
アリストライフサイエンス(株)



防除チラシ掲載農薬は年間の通し回数をカウントしていません！
ご自身の散布履歴に合わせて薬剤を検討してください！



天敵導入後防除～ハダニ対策～

☆天敵導入後1～2週間は、定着のために薬剤散布や葉かきは控えましょう！

IRAC FRAC	対象病害虫	薬剤名	予防	治療	希釈倍数	使用 時期	回数	影響日数			
								ミツハチ	マルハチ	ミヤコ	チリ
U13,9	うどんこ病・灰色かび病	ショウチノスケフロアブル	○	○	2,000倍	前日	2回	0日		0日	
25A	ハダニ類 シケメンコリダニ	スターマイトフロアブル	—	—	2,000倍	前日	2回	1日		0日	
M07, 53	うどんこ病 等	フセキワイドフロアブル※1	○	—	1,000倍	前日	4回	0日		0日	
10A	ハダニ類	ニッソラン水和剤	—	—	2,000～3,000倍	前日	2回	0日	1日		0日
U06,3	うどんこ病	パンチョTF顆粒水和剤	○	○	2,000倍	前日	2回	0日			0日
20D	ハダニ類	マイトコーネフロアブル	—	—	1,000倍	前日	2回	1日			0日
7	うどんこ病・黒色根腐病 灰色かび病・輪斑病	アフエットフロアブル	○	△	2,000倍	前日	3回	0日	1日		0日
—	うどんこ病・アブラムシ類 コナジラミ類・ハダニ類	フーモン※2	—	—	1,000倍	前日	—	0日			1日

※1 ベルクートとの回数注意

※2 野菜類登録

フルボディ

腐植酸(フルボ酸・フミン酸)→土壌の団粒化
海藻抽出成分配合→根の伸長促進



定植ストレスを軽減・活着促進！

使用例 1,000倍灌注 収穫盛期



海藻サンバ

イノチオの新しいバイオステュミラント！
育苗期の発根促進剤

- ▶ コリンによる光合成促進と発根促進
- ▶ 海藻エキスによる発根促進
- ▶ 転流を促進

育苗期・生育期：1,000倍

肥料登録番号
生第101491号

