



# キュウリ編 天敵非導入版

## 病害虫注意報 2025年2月号

inochio  
GROUP

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

春にかけてアザミウマ類の発生が多くなる時期です。  
発生を確認したら密度の低いうちに防除しましょう。

### 防除のポイント

- 青色粘着板、防虫ネットの設置
- ハウス周りの除草
- アザミウマ類が寄生しやすい新芽を確認し、密度が低いうちから防除。



## 今月のおすすめローテーション

天敵導入されない方向けです！  
導入される方は別紙をご確認ください。

時期	RAC	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数	影響日数 スワルスキー
2月 ①	2	つる枯病・菌核病 等	ロブラー水和剤	1,000倍	前日	4回	7日
	13	ミカンキロアザミウマ ミカンキロアザミウマ・ハダニ類 等	コテツフロアブル	2,000倍	前日	3回	14日
2月 ②	11, M05	べと病・うどんこ病 灰色かび病・炭疽病 等	アミスター オプティフロアブル	1,000倍	前日	4回	-
	4C	アブラムシ類・コナジラミ類	トランスフォームフロアブル	2,000倍 コナジラミ類：1,000～ 2,000倍	前日	2回	0日
2月 ③	17	菌核病・灰色かび病	ピクシオDF	2,000倍	前日	4回	-
	5	アザミウマ類・ハモグリバエ類 ウリノメイガ・コナジラミ類	ディアナSC	2,500～5,000倍 コナジラミ類：2,500倍	前日	2回	14日↑
2月 ④	7	つる枯病・うどんこ病 褐斑病	ケンジヤフロアブル	1,500倍	前日	4回	0日
	6	コナジラミ類・アザミウマ類 ハダニ類	アグリメック	500～1,000倍	前日	2回	7日

対象病害虫によって希釈倍数が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。

※（アミスター、ダコニール単剤では0日）

### ガイア蘇生

#### 成り疲れ対策！

10～14日に1回  
1kg/10a灌注

- ・静菌・静虫作用
- ・側根誘導

毛細根の発達により  
成り疲れを予防



規格：20kg

### おすすめ資材

### NEW-SB酸素

- ☆土壤に酸素を供給し、根の活動を活発に！
- ☆肥料・葉面散布剤の吸収を良くします！

混入機：10kg/10a  
動噴：100倍

