



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

## アザミウマ類の多発に注意しましょう!

### アザミウマ類



大きさは約1~2mm。細長く、小さいため見つけにくい。スリップスとも呼ばれる。新芽、新葉、花などを吸汁し、**葉の萎縮や奇形、花の褐変**を生じる。多発すると、心止まりとなることがあるが、被害の出方は品種間差が激しい。吸汁痕はカスリ状になり、銀色に見えることから、**シルバリング**と呼ばれる。  
**えそ病(TSWV)や茎えそ病(CSNV)のウイルスを媒介**する。ウイルスによっては親株から挿し穂への感染や、作業での伝染もするため注意が必要。



| 時期   | IRAC<br>FRAC | 対象病害虫                          | 薬剤名                   | 予防 | 治療 | 使用量・希釈倍数              | 使用時期        | 回数 |
|------|--------------|--------------------------------|-----------------------|----|----|-----------------------|-------------|----|
| 定植時  | P2           | 白さび病                           | inochioキクツチャ粒剤        | ○  | —  | 6~9kg/10a<br>(作条土壌混和) | 定植時         | 1回 |
| 生育初期 | M03          | 白さび病                           | ジマンダイセンフロアブル          | ○  | —  | 500~800倍              | —           | 8回 |
|      | 1B           | アブラムシ類・アザミウマ類<br>フーバ・ラジウム・ハダニ類 | トクチオン乳剤               | —  | —  | 1,000倍                | 発生初期        | 5回 |
| 消灯時  | 21A,<br>39   | アブラムシ類・アザミウマ類<br>ハダニ類・白さび病     | ハチハチ乳剤                | ○  | —  | 1,000倍                | 発生・発病<br>初期 | 4回 |
|      | 23           | アザミウマ類・アブラムシ類<br>ハダニ類          | inochio<br>セイレーンフロアブル | —  | —  | 2,000倍                | 発生初期        | 3回 |
| 発蕾時  | 19           | 白さび病                           | ポリオキシシンAL水溶剤          | ○  | ○  | 2,500倍                | 発病初期        | 8回 |
|      | 6            | アザミウマ類・ハダニ類                    | アグリメック※               | —  | —  | 500倍                  | 発生初期        | 5回 |
| 破蕾期  | 3            | うどんこ病・白さび病                     | アンビルフロアブル             | ○  | ○  | 1,000倍                | 発病初期        | 7回 |
|      | 25A          | ハダニ類                           | スターマイトフロアブル           | —  | —  | 2,000倍                | 発生初期        | 1回 |

⚠ 地域の防除事例を基に作成しています(輪菊栽培)。品種、栽培条件によっては被害が発生する場合がありますためご注意ください。さらに、展着剤・葉面散布剤等を加用する場合もご注意ください。

※花き類・観葉植物(ガーベラを除く)登録

## 海藻サンバ

イノチオの新しいバイオステミラント!  
育苗期の発根促進剤

- ▶ コリンによる**光合成促進**と**発根促進**
- ▶ 海藻エキスによる**発根促進**
- ▶ 転流を促進

育苗期・生育期：1,000倍



肥料登録番号  
生第101491号

## フルボディ

腐植酸(フルボ酸・フミン酸)→土壌の団粒化  
海藻抽出成分配合→根の伸長促進



**定植ストレスを軽減・活着促進!**

葉菜類使用例 500ml/セルトレイ 灌注 定植前

