



イノチオ防除チラシ
2025年11月号

ブロッコリー カリフラワー

inochio
GROUP

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。



この症状はどんな病気？～花蕾腐敗病・黒腐病～

【花蕾腐敗病(*Pseudomonas*属・*Pectobacterium*属)】



花蕾の一部に濃緑色の水浸状の病斑が形成され、後に、淡褐色～黒褐色に腐敗する。激しく発病すると、花蕾全体が腐敗する。曇天や降雨が続くと多発し、降雨によって伝染する。窒素過多は発病を助長する。*Pectobacterium*属菌は腐敗臭がする場合や、地際部に軟腐病を引き起こす場合もある。

【黒腐病(*Xanthomonas campestris* pv. *campestris*)】



幼苗期から収穫期まで全期間発生。発芽初期に感染した場合、子葉の水孔から病原菌が侵入し、先端の凹み部分から黒変、枯死する。本圃では主に下葉から発生し、葉縁に葉脈から外側に広がるV字形の黄色の病斑を生じる。被害が激しい場合は、根や茎の維管束にも黒変が見られ、花蕾も腐敗することがある。

FRAC	登録	対象病害	薬剤名	予防	治療	希釈倍数	使用時期	回数
24, M01	ブロッコリー	黒腐病	カッパーシン水和剤	○	○	1,000倍	7日前	4回
31	ブロッコリー	黒斑細菌病・軟腐病	スターナ水和剤	○	—	2,000倍	14日前	2回
	カリフラワー	軟腐病				2,000倍	14日前	2回
7	はなやさい類	菌核病・黒すす病・根朽病	アフエットフロアブル	○	△	2,000倍	前日	3回
11,7	はなやさい類	菌核病・黒すす病・べと病	シグナムWDG	○	○	1,500倍 (べと病:1,500～2,000倍)	7日前	2回
M01	野菜類	軟腐病・斑点細菌病・べと病	兼商クプロシールド	○	—	1,000～2,000倍 (軟腐病:1,000～1,500倍)	発病前～ 発病初期	—
	はなやさい類	黒斑細菌病・花蕾腐敗病				1,000～2,000倍	発病前～ 発病初期	—

作物によって対象病害虫や希釈倍率が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。

殺虫剤のおすすめはこちら！

IRAC	登録	対象害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数
5	ブロッコリー	ウバ類・コナガ・アザミウマ類・ハマダラメカ・アオムシ オタバコガ・ヨウムシ・ハモンヨウ・シイモリヨウ	ディアナSC	2,500～5,000倍	前日	2回
	カリフラワー	コナガ・アザミウマ類・ハマダラメカ ヨウムシ・ハモンヨウ・アオムシ				
6	ブロッコリー	コナガ・ハモンヨウ・シイモリヨウ・アオムシ	アニキ乳剤	1,000～2,000倍	3日前 前日	3回
	カリフラワー	コナガ・ハモンヨウ				
9B	ブロッコリー	アブラムシ類	コルト顆粒水和剤	4,000倍	前日	3回
	カリフラワー	アブラムシ類				
30	はなやさい類	ウバ類・コナガ・ハマダラメカ・ヨウムシ オタバコガ・ハモンヨウ・シイモリヨウ・アオムシ	ブロフレアSC	2,000～4,000倍	前日	3回
	はなやさい類	ウバ類・コナガ・アザミウマ類・オタバコガ・アオムシ ハマダラメカ・ヨウムシ・ハモンヨウ・シイモリヨウ	グレーシア乳剤	2,000～3,000倍	7日前	2回

カテキンパワーUP↑

「カテキンパワー」がパワーアップしてリニューアル!!

成分などの見直しで 汚れにくくなり使いやすさがUP!!

成分：カテキン類 野菜類使用例：500倍 1～2週間ごとに葉面散布
内容量：1リットル 肥効：樹勢回復、活着促進、生育増進

Point!

水に溶けやすくなり
汚れにくく、
散布しやすくなりました！

