



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

コナガ・菌核病の発生に注意！

コナガ



アブラナ科に寄生し、幼虫は最大10mm程度、成虫は10mm以下と小さい。葉裏に産卵し、孵化すると葉の表皮を残して食害する。多発すると、葉脈のみ残して食べつくされる。芯葉に潜り込むと、生育不良や葉が巻かない被害を引き起こす。幼虫に触れると、俊敏に跳ねて後ずさりし、白い糸を吐くこともある。葉裏で繭を作り、蛹となる。

【菌核病(*Sclerotinia sclerotiorum*)】



結球期に外葉の基部や地面に接する部分に、水浸状の病斑を形成する。病斑は茎を伝わって結球部に進行し、腐敗する。腐敗は軟腐していく場合もあるが、軟腐病のような悪臭はない。発病葉をはがすと、白色綿毛状の菌糸が密生し、やがて黒色・ネズミの糞状の菌核を形成する。菌核は被害残渣とともに土壌に残り、数年生 存する場合もある。

IRAC FRAC	対象病害虫	薬剤名	予防	治療	希釈倍数	使用時期	回数
7	株腐病・菌核病・灰色かび病・根朽病	アフエットフロアブル	○	△	2,000倍	前日	3回
7	株腐病・菌核病	カナメフロアブル	○	○	4,000倍	前日	3回
11,7	株腐病・菌核病・黒斑病・べと病	シグナムWDG	○	○	1,500倍 (べと病:1,500~2,000倍)	7日前	2回
14	株腐病	リゾレックス水和剤	○	—	500~1,000倍	7日前	3回

+チョウ目害虫にお困りの場合は…

IRAC FRAC	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数
5	ウリバ類・コナガ・アザミウマ類・ハモグリバエ類・アオムシ ハイマダラノメカ・オタバコガ・ヨウムシ・ハスモンヨトウ	ディアナSC	2,500~5,000倍	前日	2回
6	タナギンウリバ・コナガ・オタバコガ ハイマダラノメカ・ヨウムシ・ハスモンヨトウ・アオムシ	アフーム乳剤	1,000~2,000倍	前日	3回
22B	ウリバ類・コナガ・キスジノミルシ・ハイマダラノメカ オタバコガ・ヨウムシ・ハスモンヨトウ・アオムシ	アクセルフロアブル	1,000~2,000倍 (コナガ・キスジノミルシ・アオムシ:1,000倍)	前日	3回
30	ウリバ類・コナガ・ハイマダラノメカ・オタバコガ ヨウムシ・ハスモンヨトウ・シロイモジヨトウ・アオムシ	ブロフレアSC	2,000~4,000倍	前日	3回
30	ウリバ類・コナガ・アザミウマ類・ハイマダラノメカ オタバコガ・ヨウムシ・ハスモンヨトウ・シロイモジヨトウ・アオムシ	グレーシア乳剤※	2,000~3,000倍	7日前	2回

※結球あぶらな科葉菜類登録

イノチオHDでは農作物の土壌分析や病害虫診断を行っております！

詳細は各担当営業にお問い合わせください！

◎今まで土壌分析をした事が無い方
◎過去にはあるが、しばらく分析していない方
◎肥料を効率よく使いたい方
◎圃場の中で生育不良の箇所があり気になる方

イノチオの土壌分析では、化学性と生物性の両方の分析を行うことができます。

ご自身の圃場の状態を知ること、適切な肥培管理に繋がり、安定した生産をすることができます。



顕微鏡や検査キットを用いて、原因となる病原菌や虫、ウイルスを検査します。

速く・正確な診断で、適した農薬や対策をご提案いたします。

見分けが難しいものや、早急な対応が必要な病害虫も多く存在します。

間違った防除を行い、被害を広げてしまう前に、一度診断をしてみたいはいかがでしょうか？

