



イノチオ防除チラシ
2025年12月号

ナス

inochio
GROUP

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

厳寒期の病気に注意しましょう！



この症状はどんな病気？～灰色かび病・うどんこ病～

【灰色かび病(Botrytis cinerea)】



葉・葉柄・茎では褐色～暗褐色の大型病斑となり、灰褐色のカビを密生し、ほこりのように胞子が飛散する。
果実では茶褐色水浸状のくぼんだ大型斑点を生じ、灰色のカビを密生する。咲き終わった花弁などにカビを生じ、茎や葉に付着するとその部分から発病する。多発すると、がくや花柄も侵される。

【うどんこ病(Oidiopsis sicula

Sphaerotheca cucurbitaeなど)】



主に葉に発生するが、多発すると茎・果実などにも発生。葉の表面に淡い白い斑点を生じ、後に裏面も白いうどん粉を振り掛けたようになる。カビの色は白色から灰色になる。
病原菌は数種類知られており、時期や地域によって発生が異なる。酷い場合は黄褐色となって落葉する。晩秋には病斑表面に小粒点を生ずることがある。

IRAC FRAC	対象病害虫	薬剤名	予防	治療	希釈倍数	使用時期	回数
11,7	うどんこ病・褐色斑点病・褐紋病 菌核病・すすかび病・灰色かび病	シグナムWDG	○	○	1,500倍 (すすかび病: 1,500～2,000倍)	前日	3回
30	コナジラミ類・アザミウマ類・ハダニ類 ハダニ類・オオハダニ・ハダニ幼虫・チャノコリダニ	グレーシア乳剤※	—	—	2,000倍	前日	2回
17	菌核病・灰色かび病	ピクシオDF	○	○	2,000倍	前日	4回
6	コナジラミ類・アザミウマ類・ハダニ類 ハダニ類・オオハダニ・ハダニ幼虫・チャノコリダニ	アフーム乳剤	—	—	2,000倍	前日	2回
7	うどんこ病・褐色斑点病・菌核病 黒枯病・すすかび病・灰色かび病	ネクスターフロアブル	○	—	1,000倍	前日	3回
4C	アブラムシ類・コナジラミ類	トランスフォームフロアブル	—	—	1,000～2,000倍 (アブラムシ類: 2,000倍)	前日	2回
52	うどんこ病・褐紋病 菌核病・灰色かび病	ミギワ10フロアブル	○	—	1,000倍	前日	3回
23	うどんこ病・アブラムシ類・コナジラミ類・ハダニ類 アザミウマ類・コナジラミ類・チャノコリダニ	モベントフロアブル	—	—	2,000倍	前日	3回

※水なす及び賀茂なすの果実には薬害を生じるので、使用しないでください。

フセキワイド フロアブル

うどんこ病に優れた予防効果！
新規作用機作のピリダクロメチル含有

1,000倍 / 収穫前日 / 3回以内

うどんこ病・すすかび病

※ベルコート水和剤・フロアブルとの使用回数注意



おすすめ資材

ピュア酸素

- ☆ 土壌に酸素を供給し、根の活動を活発に！
- ☆ 肥料・葉面散布剤の吸収を良くします！

5～10kg/10 a
7～10日おき灌水処理

酸欠を防ぎ
根の動きを促す！

