



イノチオ防除チラシ
2025年12月号

ミニトマト

inochio
GROUP

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

低温期に注意が必要な病気



この症状はどんな病気？～疫病・灰色かび病～

【疫病(Phytophthora infestans)】



葉では灰緑色の斑点を生じ、**急速に拡大して暗緑色の大型病斑**となる。茎や葉柄には、暗褐色水浸状の病斑を生じ、後に**凹んで暗黒褐色**へ変わる。病斑が茎を取り囲むと、上部は萎凋、枯死する。果実では**未熟果が侵されやすく**、茶褐色～暗褐色の病斑を生じ、腐敗する。どの部位も**多湿時には白いカビ**を生じる。

【灰色かび病(Botrytis cinerea)】



葉では褐色～暗褐色の大型病斑となり、**灰褐色のカビ**を密生し、**ほこりのように胞子が飛散**する。葉柄や茎にも発生し、被害部より上の茎葉が枯死する。**咲き終わった花弁や柱頭にカビを生じ**、茎や葉に付着するとその部分から発病する。果実には、黄白色円形の中心のある小斑点(**ゴーストスポット**)を多数生じることがある。

IRAC FRAC	対象病害虫	薬剤名	予防	治療	希釈倍数	使用 時期	回数	影響日数 ミツバチ マルハナ	
49,40	疫病	オロンディスウルトラSC	○	○	2,000倍	前日	2回	—	
7	うどんこ病・菌核病・すすかび病 灰色かび病・葉かび病・輪紋病	ネクスターフロアブル	○	—	1,000倍	前日	3回	1日	
52	菌核病・灰色かび病	ミギワ10フロアブル	○	—	1,000倍	前日	3回	0日	
7	うどんこ病・菌核病・白絹病 すすかび病・灰色かび病・葉かび病 斑点病・褐色輪紋病	カナメフロアブル	○	○	4,000倍	前日	4回	—	
M01	疫病・かいよう病・すすかび病・葉かび病	兼商クプロシールド	○	—	1,000倍 (疫病：1,000～2,000倍)	発病前～ 発病初期	—	1日	1日 (刈)

+コナジラミ類の発生が多い場合

IRAC FRAC	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	使用 時期	回数	影響日数 ミツバチ マルハナ	
30	コナジラミ類・トマトヒゲダニ・ハモグリバエ類 アザミウマ類・オオタバコガ・ハスモンヨトウ・トマトキバガ	グレーシア乳剤	2,000倍	前日	2回	1日	
6	コナジラミ類・トマトヒゲダニ・オオタバコガ ハモグリバエ類・トマトキバガ	アフーム乳剤	2,000倍	前日	5回	2日	
23	コナジラミ類・トマトヒゲダニ	クリアザールフロアブル	2,000～4,000倍 (トマトヒゲダニ：2,000倍)	前日	2回	—	1日
UN, M10	うどんこ病・コナジラミ類・トマトヒゲダニ	パルミノ	2,000倍	前日	5回	5日	1日 (刈)

作物によって対象病害虫や希釈倍率が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。

海藻サンバ

イノチオの新しいバイオステュミラント！

育苗期の発根促進剤

▶コリンによる**光合成促進**と**発根促進**

▶海藻エキスによる**発根促進**

▶転流を促進

育苗期・生育期：1,000倍



肥料登録番号
生第101491号

おすすめ資材

ピュア酸素

☆ 土壤に酸素を供給し、
根の活動を活発に！

☆ 肥料・葉面散布剤の
吸収を良くします！

5～10kg/10 a
7～10日おき灌水処理

酸欠を防ぎ
根の動きを促す！

