

# イチゴ

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。



## 気門封鎖剤特集



薬剤	サフォイル乳剤※	フーモン	粘着くん液剤
RACコード	NC	—	—
有効成分	調合油	ポリグリセリン脂肪酸エステル	ヒドロキシプロピル化リン酸架橋デンプン
適用病害虫	うどんこ病・アブラムシ類・コナジラミ類 ハダニ類・チャノホリダニ	うどんこ病・アブラムシ類 コナジラミ類・ハダニ類	うどんこ病・ア布拉ムシ類 コナジラミ類・ハダニ類
希釈倍率	300倍 (アブラムシ類・ハダニ類: 300~500倍)	1,000倍	100倍
使用時期	前日	前日	前日
使用回数	—	—	—
特長	☆殺卵活性あり、全ステージ有効 ☆有機JAS使用可能	☆展着剤としても使用可能 ☆1,000倍希釈でも高い効果	☆優れた速効性(散布後10~20分) ☆低い環境負荷

※イチゴではオーソサイド水和剤80及びデランプロアブルとの混用不可。  
近接散布は28日以上あける。28日以上あけても下葉に薬害の恐れあり

防除チラシ掲載農薬は年間の通し回数をカウントしていません!  
ご自身の散布履歴に合わせて薬剤を検討してください!

IRAC FRAC	対象病害虫	薬剤名	予防	治療	希釈倍数	使用 時期	回数	影響日数			
								ミツバチ	マルハナ	ミヤコ	チリ
11,7	うどんこ病・炭疽病 灰色かび病	シグナムWDG※	○	○	2,000倍 (灰色かび病: 1,500~2,000倍)	前日	2回	0日	—	0日	—
—	うどんこ病・アブラムシ類 コナジラミ類・ハダニ類	フーモン	—	—	1,000倍	前日	—	0日	0日	1日	—
U13,9	うどんこ病・灰色かび病	ショウチノスケフロアブル	○	○	2,000倍	前日	2回	0日	0日	0日	—
34	アザミウマ類	ファインセーブフロアブル	—	—	1,000~2,000倍	前日	3回	1日	—	0日	—
7	うどんこ病・灰色かび病	ケンジヤフロアブル	○	—	1,500倍	前日	3回	1日	—	0日	—
25A	ハダニ類・シクラメンホリダニ	スターマイトフロアブル	—	—	2,000倍	前日	2回	1日	—	0日	—
3	うどんこ病・じゃのめ病 輪斑病	トリフミン水和剤	○	○	3,000倍 (うどんこ病: 3,000~5,000倍)	前日	5回	0日	1日	0日	—
28	アブラムシ類・コナジラミ類 アザミウマ類・ホリメコバディ ハスモントウ・チバクバナコバエ	ベネビアOD	—	—	2,000倍 (ハスモントウ: 2,000~4,000倍)	前日	3回	1日	—	0日	—

※カンタスドライフロアブルとの使用回数注意