



ミニトマト編

病害虫注意報 2024年11月号

inochio
GROUP

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

今月の 注意点

11月以降はハウスを締め切る時間が長くなり、湿度の高い時間も長くなります。多湿な条件が続くと病害が発生しやすくなるため、定期的に防除を行いましょう！



灰色かび病



発病条件：

気温20℃位の多湿条件下で発生が多くなる。

注意点：

ゴーストスポットと呼ばれる白色円形の小斑点が果実に生ずる。この被害も灰色かび病による影響である。

葉かび病・すすかび病



発病条件：

葉かび病：20～25℃

すすかび病：25～30℃

注意点：

目視での葉かび病・すすかび病の判別は難しい。潜伏期間が約2週間と長く、

無症状＝非感染ではない

かいよう病



発病条件：

25～28℃

多湿、特に濡れた傷口がある状態

注意点：

果実の症状が発生するのは、ほとんどが露地栽培のみ。

施設栽培は萎凋症状が主である。

今月のおすすめローテーション

対象病害によって希釈倍数が異なる場合があります。
ラベルの確認をしてから使用してください。

時期	RAC	対象病害	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数	影響日数 マルナバチ
11月 ①	7,11	灰色かび病・すすかび病 葉かび病 等	予・治 シグナムWDG	2,000倍	前日	2回	-
11月 ②	M01	かいよう病・すすかび病 葉かび病	予 兼商クプロシールド	1,000倍	-	-	1日 (加)
11月 ③	7	灰色かび病・すすかび病 葉かび病 等	予 アフェットフロアブル	2,000倍	前日	3回	1日
11月 ④	11	灰色かび病・すすかび病 葉かび病 等	予・治 ファンタジスタ 顆粒水和剤	2,000～ 3,000倍	前日	3回	1日
臨機	24,M01	かいよう病・葉かび病 斑点細菌病 等	予・治 カツパーシン水和剤	1,000倍	前日	5回	0日

光合能力UP！
ファイトマジック
1,000倍 葉面散布
キレートマグネシウム+各種微量元素
★葉にテリ・ツヤ・厚みUP！
★日照不良時の代謝の向上！



カテキンパワーUP
「カテキンパワー」がリニューアル!!
成分などの見直しで、
汚れにくくなり、使いやすさがUP!!
成分：カテキン類 内容量：1リットル
野菜類使用例 500倍 葉面散布 樹勢回復

