



イノチオ防除チラシ
2025年10月号

トマト

inochio
GROUP

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

クロマルハナバチってどんなハチ?



女王バチ

働きバチ

雄バチ

(アリスタライフサイエンスHPより引用)

【クロマルハナバチの特徴】

- ▶ 働きバチの数：約150~400匹
- ▶ セイヨウ種に比べて高温時にも活性が高い!
- ▶ おとなしい性格で攻撃性が低い
- ▶ メス(働きバチ, 女王バチ)とオスの区別が容易
- ▶ 在来種のため外来生物法に係る飼養許可が不要

ナチュポール・ブラック

※北海道では使用不可



◎ 白花や長花柱花には訪花しないので注意!

(アリスタライフサイエンスHPより引用)

◎ 活動の有無はバイトマークを確認!
過剰訪花の場合は次の対策をしましょう

- ・ 巣門を回収用にして、出巢制限をする
- ・ 乾燥花粉を給餌
- ・ 2~3日開放、2~3日閉じ込めの訪花制限

IRAC FRAC	対象病害虫	薬剤名	予防	治療	希釈倍数	使用 時期	回数	影響日数	
								ミツバチ	マルハナ
5	アザミウマ類・ハダカバチ類 オオハナバチ	スピノエース顆粒水和剤	-	-	5,000倍	前日	2回	3日	3~7日
M07	うどんこ病・すすかび病 灰色かび病・葉かび病	ベルコートフロアブル	○	-	2,000~4,000倍	前日	3回	0日	
34	ハダカバチ類 (シバリーフコナジラミを含む) トマトサビダニ・アザミウマ類	ファインセーブフロアブル	-	-	1,000~2,000倍 (トマトサビダニ: 1,000~4,000倍)	前日	3回	1日	
21A 16	コナジラミ類・トマトサビダニ	アプロードエースフロアブル	-	-	1,000~2,000倍 (トマトサビダニ:1,000倍)	前日	3回	-	
28	ハダカバチ類・オオハナバチ トマトサビダニ	プレバソンフロアブル5	-	-	2,000倍 (ハダカバチ類: 1,000~2,000倍)	前日	3回	1日	
7	うどんこ病・菌核病・すすかび病 灰色かび病・葉かび病・輪紋病	ネクスターフロアブル	○	-	1,000倍	前日	3回	1日	
6	コナジラミ類・トマトサビダニ ハダカバチ類	コロマイト乳剤	-	-	1,500倍	前日	2回	1日	

作物によって対象病害虫や希釈倍率が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。

フセキワイド フロアブル

うどんこ病に優れた予防効果!
新規作用機作のピリダクロメチル含有

1,000倍 / 収穫前日 / 3回
うどんこ病・すすかび病・葉かび病

※ベルコート水和剤・フロアブルとの使用回数注意



カテキンパワーUP

「カテキンパワー」がリニューアル!!

成分などの見直しで、
汚れにくくなり、使いやすさがUP!!

成分：カテキン類 内容量：1リットル
野菜類使用例 500倍 葉面散布 樹勢回復

