



イノチオ防除チラシ
2026年1月号

キク

inochio
GROUP

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

疫病の発生に注意しましょう!



この症状はどんな病気? ~疫病~



本年もどうぞよろしくお願いいたします!



【疫病(Phytophthora sp.または Phytophthora cactorum)】



初め、**地際部の茎に暗褐色で水浸状**の病斑を形成。急速に茎の上方へ拡大し、激しい場合は茎の先端付近まで侵す。病斑は葉柄茎部から葉に達し、**暗褐色になり軟化腐敗**する。病斑上には**薄霜状の白いカビ**を生じる。根も褐色腐敗し、下葉から萎凋して枯死する。
ポットマムに発生が多い。

オラクル

顆粒水和剤

疫病/2,000倍土壌灌注/3回以内
鉢上げ時又は鉢替え時又は生育期

※花き類・観葉植物

(ポット・プランター等の容器栽培)登録



時期	IRAC FRAC	対象病害虫	薬剤名	予防	治療	使用量・希釈倍数	使用時期	回数
定植時	P02	白さび病	inochioキクツチャ粒剤	○	—	6~9kg/10a (作条土壌混和)	定植時	1回
生育初期	UN M03	白さび病	ジマンダイセンフロアブル	○	—	500~800倍	—	8回
	10A	ハダニ類	ニッソラン水和剤※1	—	—	2,000~3,000倍	—	2回
消灯時	39	うどんこ病・白さび病 アブラムシ類	ピリカット乳剤	○	—	白さび病・アブラムシ類:1,000倍 うどんこ病:2,000倍	発病・発生 初期	6回
	6	アザミウマ類・ハダニ類	アグリメック※2	—	—	500倍	発生初期	5回
発雷時	11	白さび病	アミスター20フロアブル	○	○	2,000倍	発病初期	5回
	23	アブラムシ類・アザミウマ類 ハダニ類	inochioセイレーンフロアブル	—	—	2,000倍	発生初期	3回
破雷期	19	白さび病・うどんこ病※1 黒斑病※1・灰色かび病※1 アザミウマ類※1・ハダニ類※1	ポリオキシシンAL水溶剤	○	○	2,500倍	発病・発生 初期	8回
	25B	ハダニ類	ダニコングフロアブル※1	—	—	2,000倍	発生初期	1回

⚠ 地域の防除事例を基に作成しています(輪菊栽培)。品種、栽培条件によっては薬害が発生する場合があります。さらに、展着剤・葉面散布剤等を加用する場合もご注意ください。

※1:花き類・観葉植物登録

※2:花き類・観葉植物(ガーベラを除く)登録

海藻サンバ

イノチオの新しいバイオステュミラント!

育苗期の発根促進剤

- ▶コリンによる**光合成促進**と**発根促進**
- ▶海藻エキスによる**発根促進**
- ▶転流を促進

挿し芽前どぶ漬け: 1,000倍液に浸漬処理
葉面散布: 1,000~2,000倍液を散布



肥料登録番号
生第101491号

リダバイタル

テンサイ糖蜜含有 植物性アミノ酸配合

低温障害を軽減

光合成促進

生育初期: 1,000倍

NPK
7.5-5-4.5

